

Yeosu Web Contents

2022년 01월 19일 02시 28분



목차

목차	2
결핵관리사업	3
결핵관리사업	3
결핵의 감염경로	3
결핵의 증상	3
결핵검진 및 치료	3
결핵예방 안내	4



결핵관리사업

결핵은 기원전 7천년경 경 석기시대의 화석에서 그 흔적이 발견된 이래 인류 역사상 가장 많은 생명을 앗아간 감염질환으로, 주로 폐결핵 환자가 기침이나 재채기를 통하여 직접 감염되는 질병입니다.

결핵감염 예방 및 발병예방을 차단하고 조기진단을 위하여 취약계층 및 고위험군 검진확대 실시, 접촉자 조사 강화, 또한 맞춤형 집중관리를 위하여 직접복약확인 치료 확대, 결핵환자치료 및 관리지원, 전염성 결핵환자관리강화, 잠복결핵감염자 관리, 치료를 받으실 수 있습니다.

결핵의 감염경로

전염성 결핵환자의 기침, 재치기 또는 대화등을 통해 결핵균이 공기를 통해 다른 사람의 폐로 들어가게 되면 결핵균에 감염됩니다.

결핵의 증상


- 호흡기와 관련된 증상 : 기침, 가래, 객혈, 호흡곤란, 흉통
- 호흡기 이외의 전신증상 : 발열, 수면 중 식은땀, 쇠약감, 체중감소등

결핵검진 및 치료

- 대상 : 호흡기 계통에 이상소견이 있는 자 (2주 이상 기침) 환자 가족 및 환자 동거자 (특히 군 양성 환자), 기타 검진을 원하는 주민
- 기간 : 연중
- 비용 : 무료 또는 1,100원
- 검진절차 : 진료실 (접수) → 임상병리실·방사선실검사(검사) → 결과 및 통보 → 치료절차 진료(검진결과 이상 소견자) → 객담 검사 및 X선 검사 2회 이상 (임상병리실, 영상의학실) → 등록치료(폐 건강관리실)



진료실



임상병리실

결핵예방 안내

- 결핵예방에 가장 효과적인 방법으로 생후 4주 이내에 BCG접종을 받아야 합니다.
- 결핵이 의심되거나 2~3주이상 기침을 하는 사람은 결핵검사를 받아야 합니다.
- 폐 결핵환자와 접촉한경우 증상여부와 상관없이 6개월마다 정기적으로 검진을 받아야 합니다.
- 결핵, 호흡기 감염병 예방을 위한 첫걸음으로 기침, 재채기 할때 휴지나 손수건으로 입과 코를 가리고, 기침, 재채기 후 철저한 위생관리를 위하여 손을 깨끗하게 씻으며, 기침이 계속 된다면 마스크착용을 합니다.

COPYRIGHT © YEOSU. ALL RIGHTS RESERVED.

Yeosu Web Contents

