

닛소남해아그로(주)
화학사고 예방관리계획서 비상대응분야 지역사회 고지(요약서)

1. 사업장 현황

사업장 상호	닛소남해아그로(주)	사업자 등록번호	417-81-42361
대표자	시미즈 오사무, 정낙용	사업장 대표전화	061-900-3531
사업장 위치	전라남도 여수시 여수산단로 1384		
담당자	이 건 오	담당자 연락처	061-900-3531

2. 유해화학물질 취급정보

물 질	색 상	냄 새	사고위험성
아세트산에틸 (141-78-6)	▶ 무색 투명	▶ 향기로운 냄새 ▶ 에테르 비슷하고 과일향 ▶ 독특하고 잔여물이 없는 과일향	▶ 열, 충격, 마찰 또는 오염으로 인하여 폭발할 수 있음 ▶ 열 또는 화염에 노출 시 위험함
시안화나트륨 (143-33-9)	▶ 흰색	▶ 완전히 건조되었을 때 무취 ▶ 축축할 때 시안화수소의 방사 냄새 ▶ 아몬드 비슷한 냄새	▶ 열, 충격, 마찰 또는 오염으로 인하여 폭발할 수 있음 ▶ 공기, 물, 폼과의 접촉으로 격렬하게 또는 폭발적으로 반응할 수 있음
수산화나트륨 (1310-73-2)	▶ 흰색, 무색~흰색	▶ 무취	▶ 비가연성 물질, 물질 그 자체로 타지는 않지만, 가열 시 분해하여 부식성 및/또는 독성 흡을 생성할 수 있음 ▶ 일부는 산화제이며, 가연성 물질(나무, 종이, 기름, 옷가지 등)을 점화시킬 수 있음

3. 사고 시 행동요령

- 위험물질의 유출이 일어난 장소에 있는 경우 즉시 여주소방서(119) 또는 여수시청(061-659-2816)에 신고하고 다른 사람들에게 유출을 경고한 후, 그 지역을 벗어남

- 사고지점 가까이에는 바람이 불어오는 방향으로 대피하고, 멀리 떨어진 지역에는 직각 방향으로 대피할 것
- 대피 시 가능한 방독면, 물수건, 마스크 등으로 호흡기를 보호하고, 우의나 비닐로 피부가 노출되지 않도록 함
- 건물 내로 대피 시 창문을 닫고 문틈을 꼭 막아서 외부 공기가 들어오지 않도록 해야 함
- 오염된 지역 내에서는 식수나 음식물은 먹지 말고 오염이 의심되는 것은 만지지 말 것

4. 응급 조치 요령(사고 물질에 노출된 경우)

- 화학물질 정보시스템(icis.me.go.kr)을 찾아보거나, 화학물질 정보시스템(☎032-560-7328)의 전화를 통한 응급조치 요령 정보 확보토록 함.

물질	아세트산에틸
흡입	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 즉시 오염 지역을 벗어나, 신선한 공기를 깊게 호흡하게 할 것 ▶ 확인되지 않은 대기조건에서, 환자를 구조하는 경우 적절한 호흡 보호 장치를 제공할 것 ▶ 자급식 공기호흡기를 사용가능하다면 사용하고, 그렇지 않은 경우에는 보호의에 권고된 이상의 보호 단계로 조치할 것 ▶ 숨을 쉬지 않는다면 인공호흡을 실시할 것 ▶ 기침이나 호흡곤란, 입, 후두나 가슴이 타는 듯한 느낌 등과 같은 증상이 있으면 즉시 의사를 호출하고, 병원으로 환자를 옮길 준비를 할 것 ▶ 치료를 받을 것
피부	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 오염된 옷을 제거하고 격리하는 동안, 즉각 다량의 물로 노출된 피부를 씻어낼 것 ▶ 다량의 물과 비누를 사용하여 적어도 15분 정도 씻어내고 오염된 옷과 신발을 제거할 것 ▶ 홍반이나 자극이 생기면 즉시 의사에게 연락을 하고 환자를 병원에 옮기도록 준비할 것
안구	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 우선, 환자의 콘택트렌즈 착용 여부를 확인하고 착용 시 제거할 것 ▶ 환자의 눈을 물 또는 생리식염수로 20-30분간 씻어주면서, 동시에 병원 또는 중독관리 센터에 연락을 취할 것 ▶ 의사의 지시가 없이, 환자의 눈에 연고, 오일 또는 다른 약물을 투여하지 말 것 ▶ 홍반이나 자극과 같은 증상이 없더라도, 눈을 씻어낸 후, 즉시 병원으로 환자를 옮길 것
경구	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 구토를 유도하지 말 것 ▶ 환자가 의식이 있으면서 경련하지 않으면, 화학물질을 희석하기 위해서 물을 1 내지 2잔을 주고, 즉시 병원이나 중독관리센터에 전화할 것 ▶ 만약 환자에게 경련이 있거나 의식이 없으면, 입으로 어떤 것도 공급해서는 안 되고, 환자의 기도를 열고, 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것 ▶ 환자가 의식이 있으면, 2~4컵 정도 우유나 물을 줄 것 ▶ 의식이 없다면 절대 어떤 것도 주지 말 것 ▶ 의사의 권고가 있었다면, 환자를 병원으로 이송할 준비를 할 것 ▶ 즉시 환자를 병원으로 옮길 것

물질	시안화나트륨
흡입	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 신선한 공기를 호흡할 수 있도록 환자를 옮길 것 ▶ 응급대원은 시안화나트륨에 노출되지 않도록 할 것 ▶ 맥박, 호흡율과 같은 바이탈 사인을 확인하고 외상성 장애가 있는지 기록할 것 ▶ 맥박이 뛰지 않는다면, 심폐소생술을 실시할 것 ▶ 환자에게 호흡곤란이 있는지 관찰할 것 ▶ 신속히 환자들에게 100% 산소를 공급할 것 ▶ 경고: 감염을 막기 위해 구강 대 구강 인공호흡을 하지 말 것; 한 방향으로 흐르는 밸브나 다른 적절한 호흡을 돕는 의료기기를 갖춘 포켓 마스크를 이용하여 인공호흡을 실시할 것 ▶ 시안화나트륨에 오염된 사람 또는 그들의 위에 있는 내용물과 직접적 구강 접촉은 감염을 일으킬 수 있음 ▶ 해독제 사용이나 기타 조치를 취할 시, 지역병원으로부터 허가나 향후 조치를 받을 것 ▶ 즉시 의학적 도움을 취할 것 ▶ 신속히 병원으로 갈 것
피부	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 오염된 옷을 가능한 한 빨리 벗을 것 ▶ 노출된 피부 주의를 비누와 물을 이용해 2번 씻어낼 것 ▶ 추가적인 노출을 막기 위해 감염된 옷을 폐기할 것
안구	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 눈꺼풀을 들어내고 적어도 15분 동안 많은 양의 물로 완전히 눈을 세척하고 눈꺼풀을 위아래로 움직일 것
경구	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 구토를 유도하지 말 것 ▶ 토근은 시안화나트륨의 섭취 시 권장되지 않음 ▶ 해독제 사용이나 기타 조치를 취할 시, 지역병원으로부터 허가나 향후 조치를 받을 것 ▶ 토근은 다음과 같은 투약이 권장됨: 1년 이상의 아이는 10mL(1/3oz), 1-12살 아이는 15mL(1/2oz); 어른에게는 30mL(1oz) ▶ 환자가 의식이 있는 상태에서 하제나 소르비톨을 투여해 배설을 유도할 것. 어린이는 15~30g, 성인은 50~100g의 하제를 권장함 ▶ 환자가 의식이 있으면, 2~4컵 정도 우유나 물을 줄 것 ▶ 토근시럽을 티스푼으로 한 숟가락 정도 먹여서 구토를 유도할 것 ▶ 즉시 의사의 도움을 받을 것

물질	수산화나트륨
흡입	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 개인이 다량의 화학물질을 흡입하였다면, 즉시 신선한 공기를 마실 수 있도록 이동시킬 것 ▶ 환자를 따뜻하게 하고 안정을 취하게 할 것 ▶ 즉시 의사의 도움을 받을 것 ▶ 숨을 쉬지 않는다면 인공호흡을 실시할 것 ▶ 호흡 정지 시, 산소와 백 및 마스크와 같은 적절한 의학 장비를 이용하여 인공호흡을 실시할 것
피부	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 이 화학물질이 옷에 침투되었다면, 즉시 옷을 벗기고, 피부를 물로 씻어낸 후 즉시 의사의 도움을 받을 것 ▶ 의학적 조치를 취할 것 ▶ 즉시 다량의 물과 비누를 사용하여 적어도 15분 정도 씻어내고 오염된 옷과 신발을 제거할 것 ▶ 옷은 재사용 전에 세탁할 것 ▶ 추가적인 노출을 막기 위해 감염된 옷을 폐기할 것
안구	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 만약 이 물질이 눈과 접촉되었다면, 즉시 눈꺼풀을 위아래로 들어 올리면서 즉시 다량의 물로 눈을 씻어낼 것 ▶ 즉시 의학적 조치를 받을 것 ▶ 이 물질을 이용해 작업을 하는 경우, 콘택트렌즈를 착용하지 말 것 ▶ 환자가 눈을 비비거나 눈을 계속 감고 있지 못하게 할 것 ▶ 최소 30분 정도의 광범위한 세척이 요구됨
경구	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 삼켰다면, 즉시 의학적 조치를 취할 것 ▶ 구토를 유도하지 말 것 ▶ 환자가 의식이 있으면, 2~4컵 정도 우유나 물을 줄 것 ▶ 즉시 의사의 도움을 받을 것